

# LỊCH ƯƠM TRỒNG CHO ĐẤT

Thời kỳ phát triển 18 giờ trong ánh sáng	Thêm nấm vào, ở lớp bên trên của đất hoặc mụn dừa	Điều chỉnh khí hậu B.A.C.							Cho nước (cây bốc hơi) mỗi m2 ****	R.V. Không khí Độ ẩm	Nhiệt độ Nước. °C	Phòng/cây nhiệt độ Ngày-Đêm °C	Quạt đứng Mở / Tắt						
		Silica Power mỗi 10 lít nước	Chất dinh dưỡng tăng trưởng / ra hoa B.A.C. EC	Chất kích thích rễ / ra hoa B.A.C. 1-2 ml mỗi 10 L	Giá trị pH	Dinh dưỡng lá B.A.C. 20 ml mỗi 5 L	B.A.C. Pro-Active 10 ml mỗi 1 lít phun 1-3 ml mỗi 10 L cho vào *****	B.A.C. Final Solution 6 ml mỗi 10 L						B.A.C. F1 Extreme PK Booster EC 0,6					
Phát triển ngày thứ 1	1ml	1.6 groei	Chất kích thích rễ	6.0	chích 1 x									10 L	85%	22	24/24	Từ *	
Phát triển ngày thứ 2	1ml														80%		24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 3	1ml							chích 1 x							80%		24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 4	1ml	1.6 groei	Chất kích thích rễ	6.0										1 L	80%	22	24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 5	1ml														75%		24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 6	1ml														75%		24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 7	1ml	1.7 groei	Chất kích thích rễ	6.0										1.5 L	75%	22	24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 8	1ml														75%		24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 9	1ml							chích 1 x							70%		24/24	Từ	
Phát triển ngày thứ 10	1ml	1.7 groei	Chất kích thích rễ	6.0										2.0 L	70%	22	24/24	Tối thiểu	
Phát triển ngày thứ 11	1ml														70%		24/24	Tối thiểu	
Phát triển ngày thứ 12	1ml														70%		24/24	Tối thiểu	
Phát triển ngày thứ 13	1ml	1.8 groei	Chất kích thích rễ	6.0										2.0 L	70%	22	24/24	Tối thiểu	
															70%		24/24	Tối thiểu	
Thời kỳ ra hoa																			
12 giờ trong ánh sáng																			
Ra hoa tuần thứ 1	1ml	1.8 bloei	Chất kích thích rễ	6.0	chích 1 x	cho vào 1 x mỗi tuần								2.0 L	65%	22	28/20	Tối thiểu**	
Ra hoa tuần thứ 2	1ml	1.9 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần								3.0 L	60%	22	28/20	50%	
Ra hoa tuần thứ 3	2ml	2.0 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0	chích 1 x	cho vào 1 x mỗi tuần								4.0 L	60%	22	28/20	50%	
Ra hoa tuần thứ 4	2ml	2.1 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần		*****						5.0 L	55%	22	28/20	75%	
Ra hoa tuần thứ 5	2ml	2.2 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần	** cho vào 1 x							6.0 L	55%	22	28/20	75%	
Ra hoa tuần thứ 6	2ml	2.2 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần			0,6 EC Booster					8.0 L	50%	22	28/20	100%	
Ra hoa tuần thứ 7	3ml	2.2 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần			0,6 EC Booster					10.0 L	45%	22	28/20	100%	
Ra hoa tuần thứ 8	3ml	2.2 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần			0,6 EC Booster					9.0 L	40%	22	28/20	75%****	
Ra hoa tuần thứ 9	3ml	1.9 bloei	Chất kích thích ra hoa	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần			0,6 EC Booster					8.0 L	40%	22	28/20	75%****	

Làm sạch Đất / Mụn dừa và sẵn sàng để sử dụng lại; rửa với độ pH 6.0 và EC 0,4 (EC đã có trong nước) và với B.A.C. Trộn hạt sinh học đều trong đất / mụn dừa (nâng cấp). Luôn cho thêm vài túi đất mới vào. Rồi tưới đất 24 giờ với Final Solution trước khi trồng cây. Bây giờ bạn có thể tái sử dụng đất / mụn dừa. Lịch ươm trồng này là một cách để sản xuất tối đa, nhưng không nên mù quáng về giá trị EC và các lần tưới nước, bởi vì điều này phụ thuộc vào khí hậu (xem xét các cây của bạn). Vào mùa hè nên làm việc với một giá trị EC thấp hơn vì nhiệt độ cao.

- \* Không để quạt chiếu LÊN TRÊN cây trồng của bạn. Chỉ sử dụng để lưu thông không khí trong phòng.
  - \*\* Độ nhẹ nhất
  - \*\*\* Hãy chú ý đến các loại nấm có hại!
  - \*\*\*\* 3 ngày sau cùng không cho nước nữa và không chiếu quạt vào ngọn. (Cháy lá)
  - \*\*\*\*\* Trong hệ thống tuần hoàn không sử dụng nước này lại. (Chỉ chất thải muối).
- Bạn chỉ cần cho Final Solution một lần duy nhất.